

令和7年産減・減夢つくし

(5月13日 播種)
(6月5日 田植え)

栽培暦

北九州普及指導センター
J A 北 九

月別	4			5				6			7			8			9		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
水管理																			
生育ステージ																			
管理のポイント	<p>種子消毒 (温湯消毒) 60℃ 10分</p> <p>● レンゲ・菜の花 鋤き込み</p> <p>リン酸・苦土の補給に リンスター30 30 kg</p> <p><基肥> (一発肥料) 有機エムコート256 または 新スーパーユーキくん1号 60 kg / 40 kg</p> <p>移植 深植防止</p> <p>中干し 溝切り</p> <p><追肥> スーパーユーキくん3号 35 kg</p> <p>最も水が必要な時期</p> <p>○ 土づくり (ヒメトビウンカ対策) ○ 収穫後 早めの耕起 ○ 落水はなるべく遅く</p> <p>堆肥投入 又は アヅミンの投入 2 t / 40 kg ミネラルG 200 kg</p> <p>倒伏防止・病害虫対策に、けい酸加里の使用をお勧めします。基肥時40kg又は、中干し時20kg</p>																		
病害虫	<p>《夢つくしの特徴》</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ いもち病に弱いので、いもち病の常発地や野菜後等での栽培は避ける。 ☆ 倒れやすい傾向にあるので、過剰施肥にならないよう注意する。 ☆ 穂発芽しにくい。 ☆ 食味が良い。 																		
防除農薬	<p>種子消毒 ○ 温湯消毒</p> <p>箱剤 防人箱粒剤</p> <p>初中期一発除草剤 ゼータプラス200FG, ゼータプラス200FG, ゼータプラス1キロ粒剤</p> <p>※ 移植後 落水・田面の均一化</p> <p>スクミンベイト3</p> <p>※ 昨年 縞葉枯病の発生圃場は ご注意ください</p> <p>※ 除草剤 (補正) アトリ豆つぶ250</p> <p>※ 病斑が確認された場合は 防除</p> <p>※ 発生が無い場合 圃場確認</p> <p>※ 野菜後や高温多雨時は 注意</p> <p>必須① 粉剤: ダブルカットレボン粉剤3DL, 液剤: ダブルカットバリダフロアブル, トレボンEW</p> <p>必須② カメムシ剤: アルバリン顆粒水溶剤, アルバリン粉剤DL, スタークル豆つぶ</p> <p>※ 出穂後の畦畔除草はしない</p>																		
成分数	<p>③ ② ② ② ① ① ① ① ① ①</p> <p>左の成分数の合計が10成分以下</p>																		