

# 令和7年産 ヒノヒカリ

( 6月1日 播種 ) 栽培 暦  
( 6月25日頃 田植え )

北九州普及指導センター  
J A 北 九

月別	5月		6月			7月			8月			9月			10月	
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
水管理																
生育ステージ	6/1頃 播種 一箱当り 150g 以下播き		6/25頃 田植 坪当り 60株 50株 3〜4本 植え			-40日 有効分けつ終期			-30日 -25日 穂首分化期 幼穂形成期			-15日 -10日 0 減数分裂期 出穂期			8/27日頃 刈取 成熟期 10/7日頃	
管理のポイント	<p> <b>基肥</b>            きたきゅう 48            または            ベスト 444            35kg 30kg         </p> <p> <b>穂肥</b>            NK2号            幼穂 3mm 15kg         </p> <p> <b>管理のポイント</b>            良食味対策に けい酸加里 40kg            田植 深植防止            除草剤施用            溝切り            中干し  <b>最も水が必要な時期!</b>            ① 堆肥投入 2t            ② アズミンの投入 40kg            ③ 土壌改良資材施用            ④ 土づくり (ヒメトビウンカ対策)            ○ 収穫後早めの耕起            ○ 落水はなるべく遅く         </p>															
病害虫	<p> <b>病害虫</b>            ばか苗病            いもち病            ごま葉枯れ病            シンガレセンチュウ            苗立枯病            白カビ            葉いもち            ヒメトビウンカ            ヨコバイ類            スクミリンゴカイ            (ジャンボタニシ)            葉いもち            コブノメイガ            コブノメイガ            ウンカ類            紋枯病            穂首いもち            カメムシ類            トビイロウンカ            ビロウンカ         </p> <p> <b>《栽培注意点》</b>            ☆ 苗丈が長くなりやすいので、緑化後は早めに被覆資材を除去する。            ☆ 倒れやすい傾向にあるので、過剰施肥にならないよう注意する。            ☆ 後半肥料切れに注意。            ☆ 出穂2週間前までに周辺雑草を除草しカメムシ類の本田への侵入を防ぐ。         </p>															
重点防除農薬	<p> <b>育苗管理参照</b>            箱剤            フルストロクトル箱剤            ④ ③         </p> <p> <b>初中期一発除草剤</b>            アピログロウM1キロ粒剤            ラオウ1キロ粒剤            サラブレッドG0フロアブル            サラブレッドG0ジャンボ            ウイニングランジャンボ            ※移植後落水・田面の均一化         </p> <p>           ※病斑が確認された場合は防除            ※発生が無い場合圃場確認            ※野菜後や高温多雨時は注意            ※発生パターンにより補正防除         </p> <p> <b>必須①</b>            粉剤            ブラシントレバリダ粉剤DL            ③         </p> <p> <b>必須②</b>            液剤 (ヘリ防除)            エクシードフロアブル            ダブルカットバリダフロアブル            ※出穂後の畦畔除草はしない            エクシード粉剤DL            エクシードフロアブル            スタートクル豆つぶ            エミリアフロアブル            スタートクル液剤10            ① ① ① ① ①         </p> <p> <b>航空</b>            エミリアフロアブル            スタートクル液剤10            ① ①         </p> <p> <b>《防除注意点》</b>            ☆ 稲の開花期防除 (カメムシ) は、ミツバチへの影響が考えられます。近くで養蜂が行われている場合は、稲の開花期には農薬の散布を避けましょう。            ☆ 散布時期            必須①は、出穂前散布            必須②は、穂揃い期後散布            農薬散布時はドリフトに注意する!         </p>															
※ 農薬成分数	④ ③		④ ④ ④ ④ ③						③ ③ ① ①			① ① ① ① ①				